

DESCRIPTION

Nom Latin : *Ramaria brunneomaculata* Schild

Nom Français : Ramaire maculée de brun

Taxon : IUMQ2805

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Gomphales

Sous-ordre : Incertain

Famille : Gomphaceae

Genre : Ramaria

Basidiome

Jusqu'à 6,5-8 cm de hauteur, 5,5-8 cm de largeur, formé de rameaux et d'un pied

Rameaux

rameaux principaux abondants, divergents, 2-6 mm de diam., lisses, avec axes mixtes, ± étroites, en forme de U; pointes de 2-4, obtuses, jaunes à jaune sordide, mais concolores à plus claires vers l'apex

Pied

1-2,5(3) x 1,5-2 cm, irrégulièrement égal à progressivement élargi vers la base, très mou, gélatinisé, jaune ochracé pâle vers l'apex, blanc vers la base, gris-brun avec l'âge à taché de brun violacé

Contexte

Blanc sombre à blanc jaunâtre

Odeur et saveur

Odeur faible, agréable, et saveur douce

Sporée

Ochracée

Basides

Clavées, à contenu granuleux à guttulé, ± cyanophiles, à 4 stérigmates, peut-être 3, souvent jusqu'à 6,4 µm de longueur, non bouclées à la base, 48-63 x 7,2 à 12,2 µm

Spores

Irrégulièrement verruqueuses, cyanophiles, (8)8,8-14,4(14,9) x (3,5)4,2-5,4(5,6) µm

Écologie

Sur sol sous feuillus, hêtres surtout

Remarques

Cette ramaire diffère de *R. brunneicontusa* par ses basidiomes plus petits, l'absence de boucles et ses spores plus petites.

Elle pousse surtout sous feuillus.

Références


Ramaria brunneomaculata. Schild, Zeitschrift für Mykologie. 1992.

André Paul : www.flickr.com

Adaptation

Roland Labbé, juin 2024.

PHOTOS MACROS



© André Paul